ovato-triangularia, c. 2.5mm longa, 1.8mm lata, apice obtusiuscula; stamina 5, ad margine disci disciformis inserta, filamentis brevissimis c.0.25mm longis, antheris flavidis suborbicularibus vel late ellipticis 0.3—0.5mm, stylis 3(—2), brevibus, c.0.5mm longis e disco orasso exsertis, stigmate obscure, ovarium c. 1.5mm longum, inferum, 3—loculare, placenta axili, ovulis in utroque loculo c. 3—6, brunneolis. Fructus ignotus.

Guangxi(广西): Tianlin (田林), e Bantao ad Mutung (从板桃至牧童), alt. 600m, inter frutices secus rivulos, 1989.04.17, Exped. Hungshuihe 89-14(holotypus, PE; isotypus, KUN)。**Yunnan**(云南): Funing (富宁), Lida(里达), alt. 1300mm 1968.M. L. Zang (臧敏烈) s.n.

多年生草本。根状茎近圆柱形,粗 3—5mm,黑褐色,横生,生短而粗的根。叶 2,基生,叶片薄纸质,五角形,长 6—8 cm,宽 5.5—8.5cm,3 全裂,全部裂片 3—2 深裂,边缘刺状锯齿、缺刻状浅裂或 3 浅裂,边缘具带刺状小齿,齿间常有长粗毛;上面深绿色,基出脉和侧脉上具极疏较长毛,下面脉网上被极疏短粗毛,基出脉和侧脉在两面均隆起;叶柄长 8—10cm,近无毛或有极疏短粗毛。花葶高 13—18cm,无毛或近无毛,复聚伞花序,呈圆锥状排列,长 4—7.5cm,3—4 回分枝,有 10—15 朵花,分枝无毛或近无毛;苞片近膜质,宽卵形或圆卵形,长 1—3mm,顶端圆形或钝,;边缘有小齿,无毛;花梗长 2—6mm,被稀疏短腺毛或近无毛;花直径约 6mm,萼片半圆形,长 1—1.5mm,宽 2—2.5mm,边缘稍变厚,无毛;花瓣绿色,卵状三角形,长约 2.5mm,宽约 1.8mm,顶端微钝;雄蕊 5,插生于花盘边缘,花丝极短,长约 0.25mm,花药近圆形或宽椭圆形,长 0.3—0.5mm,淡黄色;花盘明显,呈盘状;花柱 3(—2),长约 0.5mm,从肥厚花盘中伸出而远离,柱头不明显,子房长约 1.5mm,下位 3 室,中轴胎座,胚珠每室 3—6 枚,着生于中轴上,淡褐色。果实未见。

赤车属一新系

A NEW SERIES OF *PELLIONIA* GAUD. (URTICACEAE)

赤车组翅茎赤车系

Sect. **Pellionia** ser. **Caulialatae** W. T. Wang, ser. nov.

Caules longitudinaliter alati. Folia penninervia, basi haud peltata; stipulae anguste lanceolatae. Folia redacea praesentia. Tepala floris pistillati apice corniculata. Achenia minute tuberculata.

Typus: *Pellionia caulialata* S. Y. Liou

Species unica, in Regione Autonoma Guangxi habitans.

王文采 *Wang Wen-tsai*(*Institute of Botany, Academia Sinica, Beijing* 100044)